

我国超八成患者血压未达标：高血压控制难题与健康隐患

我国高血压患者的管理现状令人担忧，最新数据显示，我国超八成高血压患者的血压未能达到理想的控制目标。这意味着，尽管有庞大的高血压患者群体，但真正有效控制住病情的比例却极其低下，这背后隐藏着严峻的健康挑战。血压长期居高不下，不仅会显著增加心脑血管疾病的风险，如中风、心肌梗死，还会对肾脏、视网膜等重要器官造成不可逆的损害。那么，为何高达八成的患者血压“不达标”？这其中涉及哪些复杂因素，我们又该如何应对？

为何血压控制如此困难？多重因素叠加下的挑战

导致我国超八成高血压患者血压未达标的原因是多方面的，并非单一因素能够解释。首先，患者依从性差是普遍存在的难题。部分患者对高血压的认识不足，认为“没什么感觉”就不再坚持服药，或者自行停药、减药，这是最直接导致血压反弹的原因。其次，诊断不足和漏诊也不容忽视。不少高血压患者早期症状不明显，被延误诊断，直到出现并发症才被发现，此时病情往往已经比较严重，控制起来更加困难。

再者，治疗方案的个体化不足也是一个重要因素。高血压的成因复杂，个体差异大，需要根据患者的具体情况制定个体化的治疗方案，包括药物选择、剂量调整以及生活方式的干预。但现实中，很多患者接受的是“一刀切”的治疗模式，未能充分考虑到其年龄、基础疾病、生活习惯等差异，导致治疗效果不佳。此外，医疗资源分布不均以及基层医疗机构服务能力有待提升，也影响了高血压患者的规范化管理。很多患者难以获得及时、专业的指导和随处可见的随访服务。

“不达标”血压的具体表现及潜在风险

“血压未达标”并非一个模糊的概念，它指的是患者的血压数值未能持续稳定地控制在医学推荐的健康范围内。一般来说，对于大多数高血压患者，目标血压应低于140/90 mmHg。而对于合并糖尿病、慢性肾病等特定情况的患者，目标血压可能更低，例如要求低于130/80 mmHg。当患者的收缩压（高压）或舒张压（低压）长期高于这些目标值，就属于“未达标”。

这些“不达标”的血压数值，如同在体内埋下了定时炸弹。长期的高血压会对全身血管造成“加压”式的损伤，导致动脉粥样硬化加速。这会显著增加脑卒中（中风）的风险，包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中；同时也会提高急性心肌梗死、心力衰竭等心脏疾病的发病率。此外，高血压还会对肾脏造成严重损害，导致慢性肾脏病，甚至发展为尿毒症；还会影响眼底血管，引起高血压性视网膜病变，威胁视力。

如何科学管理，让血压“达标”？

要让血压真正“达标”，需要患者、医生以及社会共同努力。

1. 积极配合，提高治疗依从性

这是最关键的一步。一旦被诊断为高血压，就意味着需要长期管理。患者应积极听从医生的建议，规律服药，切勿自行增减剂量或停药。即使感觉血压稳定，也应定期复诊，监测血压，并与医生沟通调整方案。

2. 科学生活方式，助力血压管理

药物治疗是基础，但健康的生活方式是血压控制的“绿色通道”。

- * 合理膳食：提倡低盐饮食（每日食盐量不超过5克），多吃蔬菜水果、全谷物，适量摄入优质蛋白，限制高脂肪、高胆固醇食物。
- * 规律运动：每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动，如快走、慢跑、游泳等。
- * 控制体重：保持健康的体重指数（BMI），超重或肥胖者应积极减重。
- * 戒烟限酒：吸烟是心血管疾病的重要危险因素，应坚决戒烟。过量饮酒会升高血压，应限制饮酒量。
- * 减轻压力，保证睡眠：学会有效地应对压力，保证充足的睡眠，也有助于血压控制。

3. 定期监测与随访

高血压患者应在家中备有血压计，定期测量血压，并做好记录。建议在医生指导下，根据自身情况选择合适的监测频率。此外，定期到医院复诊，接受专业评估，及时调整治疗方案，是确保持续血压达标的重要保障。

4. 关注个体化治疗

如果您觉得目前的治疗效果不佳，或者有其他合并症，务必与医生详细沟通。医生会根据您的具体情况，评估是否需要更换药物、调整剂量，或考虑联合用药。有时，选择更适合您的个体化治疗方案，会带来意想不到的改善。

常见的误区与注意事项

- * “感觉不到”就是没事：高血压常被称为“沉默的杀手”，很多患者在早期没有明显症状，但这并不意味着血压正常。
- * 迷信偏方、“神药”：网络上流传的各种“降压偏方”往往缺乏科学依据，甚至可能对身体造成损害。应始终以正规医疗途径为准。
- * 认为血压降得越低越好：血压并非越低越好，过低的血压也可能引起不适，甚至增加风险。应在医生指导下将血压控制在目标范围内。
- * 血压正常了就停药：高血压是一种慢性疾病，大部分患者需要终身服药。一旦停药，血压很可能再次升高。

我国超八成高血压患者血压未达标，这一现状敲响了健康警钟。但通过提高认识，积极配合治疗，科学管理生活方式，并接受个体化的医疗指导，每一个高血压患者都有可能实现血压的有效控制，从而远离心脑血管疾病的威胁，享受更健康的生活。